


LA SORTIE CHAMPIGNON DE L'OPTION ELDD

Pour cette sortie, nous nous sommes rendus dans la forêt d'Andaines le vendredi 10 octobre afin d'observer divers types de champignons présents à divers endroits de cette forêt.

LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE CHAMPIGNONS

Il existe quatre types de familles de champignons: la famille des champignons à lamelles (l'amanite tue-mouches), les champignons à tubes (le cèpe de bordeaux), les champignons à rides (chanterelle commune) et les champignons à dents (pied-de-mouton)



LES CÈPES DE BORDEAUX

Les cèpes de bordeaux sont des champignons très réputés pour leur goût très savoureux et très délicat fondant dans le palais une fois cuit. Le plus souvent on en fait des poêlées pour permettre de faire ressortir leur goût prononcé. Cette variété de champignon à pores, est également appelée des champignons à tubes car quand l'on regarde sous leur chapeau nous pouvons constater des sortes de petits tubes. Cette variété peut être apparente dès le mois d'août quand les températures chutent mais le plus souvent on commence à le voir au milieu du mois de septembre jusqu'à fin octobre.

L'AMANITE TUE-MOUCHES

À certains endroits, nous avons pu observer des champignons à lamelles tels que l'amanite tue-mouche. Ce champignon peut être reconnu à son rouge vif et ses écailles blanches sur le chapeau. C'est un champignon toxique, celui-ci peut engendrer de graves intoxications mais il n'est pas mortel. Il pousse principalement au mois de septembre et d'octobre, le plus souvent on les retrouve au pied des bouleaux et dans les forêts de feuillus et de conifères.

